

お客様各位

平成22年7月21日
日本化薬株式会社

「マトリックフロアブル」の適用拡大のお知らせ

拝啓

貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、マトリックフロアブル（登録番号20309号）が平成22年7月21日付で適用拡大となりましたので、お知らせいたします。

敬具

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第20309号

名称：マトリックフロアブル

2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第8項について、以下の通り変更する。

- ① 作物名「さやえんどう」を追加する。
- ② 作物名「かんしょ」に適用病害虫名として「ナカジロシタバ」を追加する。
- ③ 作物名「さくら」について、作物名を「樹木類」に、適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。

2. 適用拡大後の適用内容

別紙を参照下さい。

3. お問い合わせ先

日本化薬株式会社 アグロ事業部 営業部 普及担当

TEL 03-3237-5223

以上

【追加及び変更事項】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロマフェノジド を含む 農薬の総 使用回数
さやえんどう	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
かんしょ	ナジロシタバ			収穫7日前 まで			
樹木類	ケムシ類	—	発生初期	5回以内	5回以内		

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生じるときは、その旨及び内容
な し

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロマフェノジドを 含む農薬の 総使用回数
りんご	ケムシ類 ヨモギエダシヤク	2000倍	200～700 L/10a	収穫14日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
	ハマキムシ類	1000～ 2000倍					
なし	ケムシ類	2000倍		収穫前日 まで	3回 以内		3回以内
おうとう	ハマキムシ類	1000～ 2000倍		収穫14日 前まで			
もも	モモハモグリガ	1000倍		収穫前日 まで			
うめ	モンクロナヤチホ	2000倍		収穫3日 前まで	4回 以内		4回以内
メロン きゅうり	ウリノメイガ		収穫前日 まで				
はくさい	ヨトウムシ	1000～ 2000倍	収穫7日 前まで	3回 以内	3回以内		
ブロッコリー			100～300 L/10a			収穫前日 まで	
だいこん	ヨトウムシ ハイダグラノメイガ	2000倍	収穫7日 前まで	3回 以内	3回以内		
レタス	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	収穫21日 前まで				
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ					2000倍	
ねぎ わけぎ あさつき	シロイモシヨトウ	1000～ 2000倍	100～200 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	2回以内	
だいず	ハスモンヨトウ	2000～ 3000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで			
		8～16倍	800ml /10a				
稲	コブノメイガ	1000倍	100～200 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
		16倍	800ml /10a			無人ヘリコプ ターによる 散布	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	フロマフェジドを 含む農薬の 総使用回数	
なす	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内	
トマト	オオタバコガ	1000～ 2000倍		収穫7日 前まで				
ミニトマト				収穫前日 まで				
ピーマン				ハスモンヨトウ	4回 以内			
ししとう							収穫7日 前まで	
いちご	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫14日 前まで	3回 以内		4回以内	
キャベツ	ハスモンヨトウ ハマダラメカイ			ヨトウムシ類	収穫前日 まで		2回 以内	3回以内
非結球 あぶらな科 葉菜類	ハスモンヨトウ						2000～ 3000倍	収穫前日 まで
オクラ								
はすいも (葉柄)								
さやえんどう 実えんどう	ヨトウムシ	1000～ 2000倍	100～150 L/10a	収穫14日 前まで	4回 以内	4回以内		
えだまめ								
てんさい	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	3回以内		
しょうが	アワノメイガ			収穫7日 前まで				
未成熟とう もろこし	ハスモンヨトウ			ハスモンヨトウ カジロシタバ	200～400 L/10a		摘採7日 前まで	2回 以内
さといも	チャハマキ ヨモギエダシヤク							
かんしょ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回 以内	4回以内		
茶	ハスモンヨトウ							
きく	シイモシヨトウ							
トルコギキョウ	ケムシ類	—	—	—	5回 以内	5回以内		