

2016年3月2日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

「ダイアジノン粒剤5」の登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧いただいております殺虫剤「ダイアジノン粒剤5」(登録番号10438号)が、平成28年3月2日付で下記の通り適用拡大となりましたので、お知らせ致します。引き続き「ダイアジノン粒剤5」をよろしくお願い致します。

敬具

記

| 登録番号 | 農薬名(商品名) | 農薬の種類名 | 製造者名 |
|---------|-----------|----------|----------|
| 第10438号 | ダイアジノン粒剤5 | ダイアジノン粒剤 | 日本化薬株式会社 |

■ 変更内容

下記のとおり「適用病害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更になりました。(別紙参照)

- ① 作物名「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)」に適用病害虫名「タネバエ」を追加する。
- ② 作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)」、適用病害虫名「タネバエ、コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ③ 作物名「えだまめ」に適用病害虫名「コガネムシ類幼虫」を追加する。
- ④ 作物名「非結球レタス」、適用病害虫名「ケラ、コガネムシ類幼虫、ネキリムシ類」を追加する。
- ⑤ 作物名「ゆり」、適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ⑥ 作物名「モロヘイヤ」、適用病害虫名「ネキリムシ類」を追加する。

【本剤に関する問い合わせ先】

日本化薬株式会社 アグロ事業部 営業部営業企画担当(TEL:03-6731-5321 FAX:03-6731-5330)

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更前

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------|--|-------------------------|
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | コガネムシ類幼虫 | 4~6 kg/10a | 収穫60日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内) |
| | えだまめ | | は種前 | | | |
| 食用ゆり | ネキリムシ類 | 6 kg/10a | 定植時 | 2回以内 | 作条土壌混和 株元土壌混和 | 2回以内(植付時は1回以内、植付後は1回以内) |
| | クロバネキノコバエ類 | | 植付時 植付後、収穫30日前まで | | | |

適用病害虫の範囲及び使用方法

■変更後

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数 |
|--|----------------------------|---------------|------------------|--------------|--|--|
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | コガネムシ類 幼虫 | 4~6 kg/10a | 収穫60日前 まで | 3回 以内 | 作付前:全面土壌 混和又は作条土 壌混和 作物生育中:作条 処理して軽く覆土 | 4回以内(種子粉衣は 1回以内、粒剤は3回 以内) |
| | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | |
| 豆類(未成熟、た だし、えだまめ、さやえ んどう、実えんどうを 除く) | コガネムシ類 幼虫 | 4~6 kg/10a | は種時又は 定植時 | 2回 以内 | 全面土壌混和又 は作条土壌混和 | 3回以内(種子粉衣は 1回以内) |
| | | | えだまめ | 収穫60日前 まで | 5回 以内 | |
| えだまめ | タネバエ | 6 | は種前 | 1回 | 全面土壌混和又 は作条土壌混和 | 6回以内(種子粉衣は1 回以内、粒剤は5回以 内(生育期の処理は4 回以内)) |
| | ネキリムシ類 | | 定植時 | | 土壌表面散布 | |
| 非結球レタス | ケラ、コガネム シ類幼虫、ネ キリムシ類 | kg/10a | は種時又は 定植時 | 2回 以内 | 全面土壌混和又 は作条土壌混和 | 2回以内 |
| 食用ゆり | クロバネキノ バエ類 | | 植付時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(植付時は1 回以内、植付後は1回 以内) |
| ゆり | | | 植付後、収穫 30日前まで | | 株元土壌混和 | |
| | ゆり | | 植付時 | | 作条土壌混和 | |
| 植付後 | | | 株元土壌混和 | | | |
| モロヘイヤ | ネキリムシ類 | | 定植時 | | 土壌表面散布 | 1回 |