

平成 30 年 9 月 12 日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

「ゲザガード50」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、御慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております除草剤「ゲザガード50」（登録番号第 5818 号）が、登録内容変更となりましたのでお知らせいたします。変更後も引き続き「ゲザガード50」をご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。

敬具

記

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 5818 号	ゲザガード50	プロメトリン水和剤	日本化薬株式会社

■変更内容

下記の通り「適用病害虫の範囲及び使用方法」の登録内容が変更になりました。

農薬登録申請書第7項について、以下のとおり変更し、別紙1とする。

適用作物名「らっかせい」のプロメトリンを含む農薬の総使用回数を「1回」から「2回以内」に変更する。

■本剤に関する問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

日本化薬(株) アグロ事業部 営業部 営業企画担当

電話：03-6731-5321 FAX：050-3730-7867

別紙 1

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	プロメトリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
らっかせい	畑地一年生 雑草	は種直後	砂壤土～ 埴土	100～200	50～100	1回	全面 土壌散布	2回以内
だいず とうもろこし いんげんまめ あずき				g/10a	ℓ/10a			1回
キャベツ (春～夏播 移植栽培)		定植活着直後				うね間 土壌散布		
麦類		は種直後		150～200			全面 土壌散布	2回以内
にんじん				g/10a				
桑		雑草発生初期及 び夏切後雑草盛 期		200～300		2回以内		
				g/10a				

註：（１）表中の薬剂量は洪積土壌における使用量を示し、沖積土あるいは砂壤土の場合は薬剂量を減らすか使用しない方がよい。

（２）桑園等の雑草発生盛期処理には展着剤を加用すること。