

令和3年10月5日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

「日本化薬ダイアジノン®水和剤 34」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております、殺虫剤「日本化薬ダイアジノン®水和剤 34」（登録番号第 4250 号）が令和3年9月29日付で登録内容変更（適用病害虫の追加）となりましたので、お知らせいたします。

変更後も引き続き、「日本化薬ダイアジノン®水和剤 34」をご愛顧いただけますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名
第 4250 号	日本化薬ダイアジノン水和剤 34	ダイアジノン水和剤

ダイアジノンは日本化薬(株)の登録商標

■変更内容

以下のとおり「適用病害虫名」が変更になりました。

- (1) 適用作物「もも」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ若齢幼虫」を「カイガラムシ類」へ変更する。

変更後の内容につきましては、別紙をご参照ください。

■本剤に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1

日本化薬(株) アグロ事業部 営業部 マーケティング担当

電話：03-6731-5321 FAX：050-3730-7867

別紙

適用拡大後の適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイズロンを含む農薬の総使用回数
りんご	モシクイガ、ナヒメシクイ、リンゴハナジウムシ、モンロトクガ、リンゴフユシヤク、リンゴワタムシ	1000倍	200～700リットル/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、オオワコナカイガラムシ若齢幼虫、ナシゲンバイ、キンモンホリガ、アメリカシロヒトリ	1000～1500倍					
日本なし 西洋なし	コナカイガラムシ類若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、ナシゲンバイ、アメリカシロヒトリ	1000～1500倍		収穫14日前まで	6回以内		6回以内 (休眠期は1回以内)
	モンロトクガ、シクイムシ類	1000倍					
もも	カイガラムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類	1000～1500倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
	シクイムシ類	1000倍					
初刈り	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類	1000～1500倍		収穫21日前まで	3回以内		3回以内
	アブラムシ類、ハマキムシ類、ナシゲンバイ、アメリカシロヒトリ	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
おうとう	ウメシロカイガラムシ	1000倍		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	シクイムシ類	1000～1500倍					
小粒核果類 (すももを除く)	アブラムシ類、ハマキムシ類、アメリカシロヒトリ	1000～1500倍					
すもも	シクイムシ類	1000倍					
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、ミドリヒメコバエ	1000～1500倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内
大粒種ぶどう	オオワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アメリカシロヒトリ	1000倍	収穫45日前まで	4回以内	4回以内		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイズノを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	キバシマルトビムシ	600倍	100~300 リットル /10a	収穫30日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
	コナガ、アブラムシ類	2000倍						2回以内 (粒剤の生育 期の処理は1 回以内)
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000倍						
ブロッコリー カリフラワー	キバシマルトビムシ	600倍					2回以内 (は種時及び は種前の土 壌混和合計1 回以内)	
ブロッコリー カリフラワー	コナガ、アブラムシ類	2000倍						
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000倍						
ほうれんそ う	アブラムシ類	2000倍		収穫21日 前まで	2回以内		2回以内	
ねぎ	アブラムシ類							
ねぎ	アザミウマ類	600~ 1000倍						2回以内
	キバシマルトビムシ	600倍						
たまねぎ	アブラムシ類	2000倍		3回以内				
	アザミウマ類	1000倍						
にんにく	キバシマルトビムシ	600倍		収穫14日 前まで	4回以内		4回以内 (粒剤の生育 期の処理は3 回以内)	
しろり	アブラムシ類	2000倍						
	ハダニ類	600~ 1000倍						
すいか メロン	キバシマルトビムシ	600倍	3回以内					
	アブラムシ類	2000倍						
		ハダニ類	600~ 1000倍					
かぼちゃ	キバシマルトビムシ	600倍	収穫21日 前まで	3回以内	3回以内 (植付前の土 壌混和は1 回以内)			
	アブラムシ類	2000倍						
		ハダニ類	600~ 1000倍					
なす(露地栽 培)	テントウムシダマシ、アブラムシ類	2000倍	収穫開始 3日前まで	3回以内	3回以内 (粒剤の生育 期の処理は2 回以内)			
	ハダニ類	1000倍						
ばれいしょ	テントウムシダマシ、アブラムシ類	2000倍	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内			
樹木類	アメリカシロヒトリ	1000~ 1500倍	200~700 リットル /10a	発生初期	4回以内	4回以内		

以上