

令和4年8月30日

お客様各位

日本化薬株式会社
アグロ事業部

「ファインセーブ®フロアブル」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております殺虫剤「ファインセーブ®フロアブル」（登録番号第24070号）が令和4年8月30日付で登録内容変更（適用作物及び適用病害虫の追加）となりましたので、お知らせいたします。

変更後も引き続き、「ファインセーブ®フロアブル」をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名
第24070号	ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤

ファインセーブは登録商標第5543984号

■変更内容

以下のとおり「作物名」及び「適用病害虫名」が変更になりました。変更後の内容につきましては、別紙をご参照ください。

- （1）作物名「ししとう」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「1000～2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- （2）作物名「しそ」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- （3）作物名「しょくようほおずき」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- （4）作物名「にんにく」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- （5）作物名「バジル」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。

- (6) 作物名「きく(葉)」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- (7) 作物名「食用ぎく」、適用病害虫名「アザミウマ類」、希釈倍数「2000倍」、散布液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。

■本剤に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1

日本化薬㈱ アグロ事業部 営業部 マーケティング担当

電話：03-6731-5321 FAX：050-3730-7867

別紙

変更後の適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロムキンを含む農薬の総使用回数					
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～4000倍	200～700 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内					
	アザミウマ類											
マンゴー	タバココナジラミ類※	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内					
なす	アザミウマ類	1000～2000倍										
	トマト	トマトサビダニ						1000～4000倍				
トマト	タバココナジラミ類※	1000～2000倍										
	ミニトマト	トマトサビダニ						1000倍				
ミニトマト	アザミウマ類	1000～2000倍										
	ピーマン	タバココナジラミ類※						1000倍				
すいか、いちご	アザミウマ類	1000～2000倍										
はくさい	アオムシ	1000倍						100～800 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	コナガ	1000～2000倍							収穫3日前まで			
	アザミウマ類											
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ	1000倍	収穫14日前まで									
	アザミウマ類											
だいこん	コナガ	1000～2000倍	収穫3日前まで									
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	収穫3日前まで									
	ネギハモグリバエ											
わけぎ あさつき	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000倍	収穫前日まで									
にら	アザミウマ類		収穫3日前まで									
たまねぎ		1000～2000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内							
ほうれんそう	アザミウマ類	2000倍	100～800 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内					
アスパラガス												
茶	チャノホソガ	2000倍～4000倍	200～400 ℓ/10a	摘採14日前まで								
	チャノキイロアザミウマ	1000倍～4000倍										
ししとう	アザミウマ類	1000～2000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内					
しそ												
しよくようほおずき		2000倍			100～300 ℓ/10a			発生初期	2回以内	2回以内		
にんにく												
バジル												
きく												
きく(葉)												
食用ぎく												

※シルバーリーフコナジラミを含む