

マトリックフロアブルの天敵、訪花昆虫影響表
●天敵への影響

種類名	卵	成虫	安全日数(日)
ククメリスカブリダニ	◎	◎	0
ケナガカブリダニ	◎	◎	0
スワルスキーカブリダニ	◎	◎	0
ディジェネランスカブリダニ	◎	◎	0
チリカブリダニ	◎	◎	0
ミヤコカブリダニ	◎	◎	0

種類名	蛹	成虫	安全日数(日)
イサエアヒメコバチ	—	◎	—
オンシツツヤコバチ	◎	◎	0
ハモグリコマユバチ	—	◎	—
ヨトウタマゴバチ	◎	—	—

種類名	幼虫	成虫	安全日数(日)
クサカゲロウ	◎	—	—
クロヒョウタンカスミカメ	◎	◎	0
ショクガタマバエ	—	◎	—
タイリクヒメハナカメムシ	—	◎	—
タバコカスミカメ	◎	◎	0
ナミテントウ	◎	—	—
ナミヒメハナカメムシ	—	◎	—
ムナグロキイロカスミカメ	◎	—	—

種類名	卵	幼虫	安全日数(日)
ナナホシテントウ	◎	◎	—

種類名	孢子	防除効果に対する影響
パーティシウム レカニ	◎	◎

◎：死亡率 0-30%(室内試験) ; 0-25%(野外・半野外試験)

—：試験データなし

●訪花昆虫への影響

種類名	成虫	安全日数(日)
セイヨウミツバチ	◎	1
マルハナバチ	◎	1
マメコバチ	◎	—

◎：死亡率0-30% —：試験データなし