

環境にも天敵にもやさしい実りき。

殺虫剤

マトリック®

フロアブル

MATRIC flowable

マトリックフロアブルの3つの特長

幅広い作物に使用できる
IGR剤です。
(脱皮促進、摂食障害)

ミツバチ・マルハナバチなどの訪花昆虫や、
多くの天敵類にほとんど影響を与えずに、
チョウ目害虫を防除できます。

総合的害虫管理(IPM)への
組み込みが可能です。

マトリックは日本化薬(株)の登録商標です。



環境にも天敵にもやさしいマトリック

農林水産省登録
第20309号

殺虫剤分類 18

有効成分：クロマフェノジド【2'-tert-ブチル-5-メチル-2'-(3,5-キシロイル)クロマン-6-カルボヒドラジド】 ……5.0%

その他成分：水、界面活性剤等(ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル(化管法1種)3.0%を含む) ……95.0%

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物* *毒性の項の普通物とは毒劇物に該当しないものを指している通称

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年11月現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロマフェノジドを含む 農薬の総使用回数
りんご	ケムシ類	2000	200~700ℓ	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヨモギエダシヤク	1000~2000					
なし	ハマキムシ類	2000	200~700ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ケムシ類	1000~2000					
おうとう	ハマキムシ類	2000	200~700ℓ	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
グアバ(果実)	モモハモグリガ	1000					
もも	モンクロナシャチホコ	2000	200~700ℓ	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
うめ	ウリノメイガ	1000~2000					
メロン、きゅうり	ヨトウムシ	2000	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	ハイマダラノメイガ	2000					
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	1000~2000	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	オオタバコガ	1000~2000					
レタス	ハスモンヨトウ	2000	100~200ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
非結球レタス	シロイチモジヨトウ	1000~2000					
ねぎ、わけぎ、あさつき	ハスモンヨトウ	1000~2000	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	コブノメイガ	1000					
だいず	ハスモンヨトウ	2000~3000	100~200ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
稲	ハスモンヨトウ	8~16					
なす	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
トマト	オオタバコガ	1000~2000					
ミニトマト	オオタバコガ	1000~2000	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ピーマン	ハスモンヨトウ	2000					
ししとう	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
いちご	ハスモンヨトウ	2000					
キャベツ	ハイマダラノメイガ	2000	100~300ℓ	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球あぶらな科葉菜類	ヨトウムシ類	2000					
しそ	ヨトウムシ類	2000	100~150ℓ	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
みつば	ヨトウムシ	1000~2000					
せり※	ハスモンヨトウ	1000~2000	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
せり(水耕栽培)※	ハスモンヨトウ	16					
パセリ	ハスモンヨトウ	32	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
オクラ	ハスモンヨトウ	2000					
はすいも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
さやえんどう、実えんどう	ハスモンヨトウ	2000~3000					
えだまめ	ヨトウムシ	1000~2000	100~300ℓ	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
てんさい	ヨトウムシ	1000~2000					
しょうが	ハスモンヨトウ	16	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
未成熟とうもろこし	アワノメイガ	2000					
やまのいも	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
みずいも※	ハスモンヨトウ	2000					
さといも	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	ナカジロシタバ	1000~2000					
茶	チャノコカクモンハマキ	1000~2000	200~400ℓ	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノホソガ	1000					
きく	ヨモギエダシヤク	2000	100~300ℓ	発生初期	4回以内	散布	4回以内
トルコギキョウ	ハスモンヨトウ	2000					
樹木類	ケムシ類	—	—	—	5回以内	散布	5回以内

※適用場所：せり(水耕栽培)はガラス室等の温室、せり・みずいもは水田

△ 効果・薬害の注意事項

- 散布液調製時には、容器をよく振ってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および栽培方法に合わせ調製してください。
- 無人航空機散布に使用する際の注意
 - ・ 各散布機種種の散布基準に従ってください。
 - ・ 散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・ 散布液が漏れないように機体の配管、散布装置を十分に点検してください。
 - ・ 水源地、飲料用水、養殖池等に本剤が飛散流入しないよう十分注意してください。
 - ・ 使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。
 - ・ 使用後の機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は、河川等に流さないでください。
 - ・ 空容器は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水耕栽培に使用する場合、本剤を使用した施設からの廃液をかんがい水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理してください。
- 畜に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、糞に付着するおそれのある場所では使用しないでください。



- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△ 安全使用上の注意事項

- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管…密栓し、直射日光を避け、**食品と区別して**、冷涼なところに保管してください。
 火災時の措置…火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
 漏出時の措置…漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
 輸送上の注意…移送取扱いは、ていねいに行ってください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。● 防除日誌に記載しましょう。

※本印刷物は2023年11月の登録内容に準拠して作成しました。