

畑の常備薬

ダイアジン® 粒剤5

農林水産省登録 第10438号

殺虫剤分類 1B

- 有効成分：ダイアジノン(化管法1種).....5.0%
(2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6)-ジエチルチオホスフェート
- その他成分：不活性鉱石粒状物及び結合剤等.....95.0%
- 性状：類白色細粒
- 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

土壌害虫

●タネバエ



種の周辺に幼虫が生息するため、薬剤が種の周辺に集中するよう、は種時に撒き溝やうね土に散布し軽く混和します。

●ネキリムシ類



●ケラ



播種・定植時に全面または作条に散布し、混和してください。
幼虫は地際部に寄生しているため、できるだけ浅く混和します。

上手な使い方

- 幼虫は地際に寄生しているため、できるだけ浅く混和します。

浅く混和



深く混和




注意事項 (抜粋)

- とうもろこしおよび飼料用とうもろこしに茎葉散布する場合には、部分的に薬剤が集まると薬害を生じる恐れがあります。葉の付け根など1ヶ所に固まることのないように均一に散布してください。降雨や朝露などで葉上に水滴があると薬害を助長するので、朝夕や降雨の前後には使用しないでください。
- ビニールハウス等の同一施設内において、収穫期が異なる作物を栽培している場合、本剤を土壌表面散布で使用しないでください。

ダイズの子実害虫

●マメシクイガ



幼虫はだいずの内部を食害します。関東、中部以北の寒冷地に多い害虫です。

●カメムシ類



ダイズを加害するカメムシは主な種だけでも10種以上います。
幼虫、成虫ともにサヤの表面から口針を刺し込んで内部の種実を吸汁、加害します。

上手な使い方

- 8月中旬～9月中旬に害虫の発生にあわせて1～2週間間隔で1～2回処理します。
- 畑全面に散布してください。



この印刷物は2024年6月現在の登録内容に準拠して作成しました。

日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号(明治安田生命ビル)
TEL.03-6731-5321 FAX.050-3730-7867

DPDZ5G018Y2406Z3000

畑の常備薬

ダイアジン® 粒剤5



- タネバエ・ネキリムシ類・ケラなどの土壌害虫に幅広く使えます。
- ダイズ畑への生育期散布で主要な子実害虫を同時防除できます。
- 60種以上の作物群に適用があり幅広く使えます。

ダイアジンは日本化薬(株)の登録商標

日本化薬株式会社

製品ページ
ダイアジノン粒剤5の
Q&Aなどはこちら



作物からさがす
ダイアジノン粒剤5を
使える作物をさがす
のはこちら



ダイアジノン[®]粒剤5 適用病害虫及び使用方法

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋は圃場等に放置せず、適切に処理してください。

作物名	適用病害虫名	使用量 kg/10a	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む 農業の総使用回数
ブルーベリー		6	収穫14日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
かんしょ	コガネムシ類幼虫	4～6	収穫30日前まで	3回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	3回以内 （マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、 マイクロカプセル剤の散布は2回以内、 粒剤の散布は2回以内）
	ケラ、ネキリムシ類		植付前	1回	全面土壌混和又は作条土壌混和	3回以内 （植付前の土壌混和は1回以内）
			は種時又は定植時	2回以内		
キャベツ	タネバエ ネキリムシ類	6	定植時	1回	全面土壌混和 土壌表面散布	2回以内
	コガネムシ類幼虫	4～6	収穫30日前まで	2回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	2回以内 （粒剤の生育期の処理は1回以内）
ブロッコリー カリフラワー	ケラ、ネキリムシ類		は種時又は定植時		全面土壌混和又は作条土壌混和	
	ネキリムシ類	6	定植時	1回	土壌表面散布	
レタス		4～6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	2回以内
非結球レタス	ケラ、ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫			6		
		4		1回	土壌表面散布	1回
はくさい	ネキリムシ類	6	定植時			
トマト ピーマン	ケラ、ネキリムシ類	4～6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	3回以内 （生育期は2回以内）
	コガネムシ類幼虫		収穫開始10日前まで	3回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	
ミニトマト	ケラ、ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	3回以内 （粒剤の生育期の処理は2回以内）
なす	コガネムシ類幼虫		収穫前日まで 収穫開始3日前まで	3回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	
	ケラ、ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	
とうがらし類			収穫開始14日前まで	3回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	4回以内 （種子粉衣は1回以内、 粒剤は3回以内）
豆類 （種実、ただし、だいず、 あずき、いんげんまめ、 らっかせいを除く）	コガネムシ類幼虫		収穫60日前まで			
	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	
だいず えだまめ	コガネムシ類幼虫、タネバエ	4～6	収穫30日前まで	5回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	6回以内 （種子粉衣は1回以内、 粒剤は5回以内 （生育期の処理は4回以内）
	マメシンクイガ、カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ			4回以内	散布	
	フタスジヒメハムシ ネキリムシ類	6		5回以内	土壌表面散布	
あずき	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	4回以内 （種子粉衣は1回以内、 は種時の処理は1回以内、 生育期の処理は3回以内）
	コガネムシ類幼虫	4～6	収穫60日前まで	4回以内 2回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	3回以内 （種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内）
いんげんまめ	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	1回
	コガネムシ類幼虫	4～5	は種前		全面土壌混和又は作条土壌混和	
らっかせい		4	は種時	1回	作条土壌混和	3回以内 （種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内）
豆類 （未成熟、ただし、 えだまめ、さやえんどう、 実えんどうを除く）	コガネムシ類幼虫				4～6	は種時又は定植時
さやえんどう 実えんどう	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	6回以内 （種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内、 乳剤は3回以内）
ねぎ、わけぎ、あさつき	コガネムシ類幼虫	4～6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	2回以内
					作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	
たまねぎ	タネバエ、タマネギバエ	6	収穫30日前まで	1回	土壌表面散布	2回以内
	タネバエ、タマネギバエ ケラ、コオロギ	3～5	は種時又は定植時		作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	
葉たまねぎ	コガネムシ類幼虫	4～6	は種時	1回	全面土壌混和	2回以内 （は種時の土壌混和は1回以内、 定植時の土壌混和は1回以内）
	タネバエ、タマネギバエ ケラ、コオロギ	3～5	定植時			
	コガネムシ類幼虫	4～6				
らっきょう	ネダニ類	6	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	タネバエ		は種時	1回	作条土壌混和又は土壌表面散布	2回以内 （は種時及びは種前の 土壌混和は合計1回以内）
	ヒメクロユスリカ		は種前		土壌混和	
すいか、メロン	コガネムシ類幼虫	4～6	収穫14日前まで	4回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	4回以内 （粒剤の生育期の処理は3回以内）
	ケラ、ネキリムシ類					
にがうり	コガネムシ類、タネバエ ネキリムシ類	6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は作条土壌混和	2回以内
きゅうり	ケラ、ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫、タネバエ					
かぼちゃ	ケラ、ネキリムシ類	4～6	収穫21日前まで	4回以内	作付前：全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中：作条処理して軽く覆土	4回以内 （粒剤の生育期の処理は3回以内）
	コガネムシ類幼虫					

作物名	適用病害虫名	使用量 kg/10a	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む 農薬の総使用回数		
かぶ	キスジノミハムシ	6	収穫45日前まで	2回以内	は種時：作条散布 作物生育中：株元散布	2回以内 （生育期は1回以内）		
	ネキリムシ類		出芽時	1回	土壌表面散布			
だいこん	キスジノミハムシ		は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで	2回以内	は種時：作条土壌混和 作物生育中：株元土壌混和			
	ネキリムシ類	生育期 但し、収穫21日前まで	1回	土壌表面散布				
	ヒメダイコンバエ			作条土壌混和				
はつかだいこん	コガネムシ類幼虫、ケラ タネバエ、ネキリムシ類	4～6		は種時	全面土壌混和又は作条土壌混和			
	ネキリムシ類	6	生育期 但し、収穫21日前まで	土壌表面散布				
	キスジノミハムシ		は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで	2回以内	は種時：作条土壌混和 作物生育中：株元土壌混和			
にんじん	ネキリムシ類	4～6	は種前	1回	全面土壌混和	2回以内 （は種前及びは種時は合計1回以内、 生育期は1回以内）		
未成熟とうもろこし	アワノメイガ		収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ヤングコーン	ネキリムシ類	6	出芽時	1回	土壌表面散布	1回		
とうもろこし （子実）	アワノメイガ	4～6	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内		
いちご	コガネムシ類幼虫		植付時（仮植床） 定植時（本圃）	1回	土壌混和			
非結球あぶらな科葉菜類 （こまつな、みずな、 ケール、ひろしまなを除く）	ケラ、キスジノミハムシ	は種時	全面土壌混和					
	ネキリムシ類	は種時又は定植時						
こまつな	ケラ、キスジノミハムシ	は種時	土壌表面散布					
	ネキリムシ類	は種時又は定植時						
みずな	ケラ	出芽時	全面土壌混和					
	ネキリムシ類、キスジノミハムシ	は種時						
ひろしまな	ケラ、キスジノミハムシ	は種時又は定植時			1回			
	ネキリムシ類	は種時						
	ダイコンハムシ	は種時又は定植時						
なばな	ネキリムシ類	定植時	全面土壌混和					
なばな類 （はなっこりー、 なばなを除く）	ケラ、ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	4	は種時		1回			
はなっこりー	ネキリムシ類		定植時	作条土壌混和				
畑わさび	ワサビクダアザミウマ ワサビルリイロサルソウムシ	3	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内		
ふき	フキアブラムシ	4	収穫30日前まで	3回以内	株元散布	3回以内		
ふき （ふきのとう）			萌芽前、 但し収穫150日前まで	2回以内		2回以内		
食用ゆり	クロバネキノコバエ類	6	植付時 植付後、収穫30日前まで	1回	作条土壌混和 株元土壌混和	2回以内 （植付時は1回以内、植付後は1回以内）		
たらんき	ネキリムシ類		種根定植後～萌芽前 種根定植後 但し、萌芽後～萌芽後30日		土壌表面散布	2回以内 （萌芽前は1回以内、萌芽後は1回以内）		
にら		5	定植時	作条土壌混和	1回			
もりあざみ	ネキリムシ類	6	は種時 収穫開始30日前まで	2回以内	土壌表面散布	2回以内		
オクラ		9	植付前	1回	全面土壌混和	1回		
葉にんにく	6	は種時又は定植時						
ははこぐさ		は種時						
なすな はこべ こおにたびらこ								
ごま	4	は種前						
ごぼう		は種時						
みつば	タネバエ	6	は種前	2回以内	2回以内			
モロヘイヤ	ネキリムシ類		定植時					
さとうきび	ハリガネムシ類					出芽時		
飼料用とうもろこし（子実）	ネキリムシ類		収穫60日前まで				2回以内	散布
飼料用とうもろこし（青刈り）	タマネヤガ		定植時			1回	植溝土壌混和	1回
桑	ハリガネムシ		植付時				作条土壌混和	2回以内 （植付時は1回以内、植付後は1回以内）
ゆり	クロバネキノコバエ類	植付後	株元土壌混和					
芝	シバツトガ、スジキリヨトウ シバオサゾウムシ成虫	6～9	発生初期	4回以内	散布	4回以内		
	コガネムシ類幼虫	9						