

ダイアジノン粒剤5

登録番号	第10438号
農薬の種類	ダイアジノン粒剤
農薬の名称	ダイアジノン粒剤5
殺剤毒性	著

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総 使用回数
ブルーベリー		6kg	収穫14日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
かんしょ	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫30日前まで	3回以内	作付前:全面土壌混和又は 作条土壌混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	3回以内 (マイクロカプセル剤の作付前 の処理は1回以内、マイクロ カプセル剤の散布は2回以内 粒剤の散布は2回以内)
	ケラ ネキリムシ類		播付前	1回	全面土壌混和又は 作条土壌混和	
ばれいしょ			は種時又は定植時	2回以内		3回以内(播付前の土壌混和 は1回以内)
キャベツ	タネバエ	6kg	定植時	1回	全面土壌混和	2回以内
	ネキリムシ類				土壌表面散布	
ブロッコリー、カリフラワー	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫30日前まで	2回以内	作付前:全面土壌混和又は 作条土壌混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	2回以内 (粒剤の生育期の処理は 1回以内)
	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時		全面土壌混和又は 作条土壌混和	
	ネキリムシ類		定植時		1回	
レタス		4~6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作条土壌混和	2回以内
非結球レタス	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	6kg				
はくさい		4kg	定植時	1回	土壌表面散布	1回
	ネキリムシ類	6kg				
ミニトマト	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫前日まで	3回以内	作付前:全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理 して軽く覆土	3回以内 (生育期は2回以内)
	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作条土壌混和	
トマト、ピーマン	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫開始10日前ま で	3回以内	作付前:全面土壌混和又は 作条土壌混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	3回以内 (粒剤の生育期の処理は 2回以内)
			収穫開始3日前まで			
なす	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作条土壌混和	
とうがらし類	ケラ ネキリムシ類	4~6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作条土壌混和	3回以内 (生育期は2回以内)
			収穫開始14日前ま で	3回以内	作付前:全面土壌混和又は 作条土壌混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	
豆類(種実、ただし、だいず、あず き、いんげんまめ、らっかせいを 除く)	コガネムシ類幼虫		収穫60日前まで			
	タネバエ	4kg	は種時	1回	作条土壌混和	
だいず、えだまめ	コガネムシ類幼虫 タネバエ	4~6kg	収穫30日前まで	5回以内	作付前:全面土壌混和又は 作条土壌混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	6回以内 (種子粉衣は1回以内 粒剤は5回以内 (生育期の処理は4回以内))
	マメシクイガ、カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ			4回以内	散布	
	フタスジヒメハムシ ネキリムシ類	6kg	5回以内	土壌表面散布		

ダイアジノン粒剤5は「ズッキーニ」に農業登録を取得していません、ご注意ください。
 (ズッキーニはかぼちゃに含まれません)

作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農業の総 使用回数
あずき	タネバエ	4kg	は種時	1回	作業土壌混和	4回以内 (種子粉衣は1回以内 は種時の処理は1回以内 生育期の処理は3回以内)
	コガネムシ類幼虫	4~8kg	収穫60日前まで	4回以内	作付前:全面土壌混和又は 作業土壌混和 作物生育中:作業処理して 軽く覆土	
いんげんまめ	タネバエ	4kg	は種時	1回	作業土壌混和	3回以内 (種子粉衣は1回 以内、殺剤は2回以内)
	コガネムシ類幼虫	4~5kg	は種前		全面土壌混和又は 作業土壌混和	
らっかせい	タネバエ	4kg	は種時	2回以内	作業土壌混和	3回以内 (種子粉衣は1回以内 殺剤は2回以内)
	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時又は定植時		全面土壌混和又は 作業土壌混和	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、 さやえんどう、実えんどうを除く)	タネバエ	4kg	は種時	2回以内	作業土壌混和	3回以内 (種子粉衣は1回以内 殺剤は2回以内)
	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時又は定植時		全面土壌混和又は 作業土壌混和	
さやえんどう 実えんどう	タネバエ	4kg	は種時	1回	作業土壌混和	6回以内 (種子粉衣は1回以内 殺剤は2回以内 乳剤は3回以内)
ねぎ、わけぎ、あさつき	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時又は定植時 収穫30日前まで	2回以内	全面土壌混和又は 作業土壌混和	
たまねぎ	ケラ コオロギ	3~5kg	は種時又は定植時		2回以内	作付前:全面土壌混和 又は作業土壌混和 作物生育中:作業処理 して軽く覆土
	タネバエ タマネギバエ	6kg	収穫30日前まで	土壌表面散布		
	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時	全面土壌混和		
葉たまねぎ	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種時の土壌混和は1回 以内、定植時の土壌混和は 1回以内)
	タネバエ、タマネギバエ ケラ、コオロギ	3~5kg	定植時			
	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時			
らっきょう	ネダニ類	6kg	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	タネバエ	6kg	は種時	1回	作業土壌混和又は 土壌表面散布	2回以内 (は種時及びは種前の 土壌混和は合計1回以内)
	ヒメクロユスリカ		は種前		土壌混和	
すいか、メロン	コガネムシ類幼虫	4~8kg	収穫14日前まで	4回以内	作付前:全面土壌混和又は 作業土壌混和 作物生育中:作業処理して 軽く覆土	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)
	ケラ、ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作業土壌混和	
いがり	コガネムシ類、タネバエ ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和又は 作業土壌混和	2回以内
きゅうり	ケラ、ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫、タネバエ	4~8kg	収穫21日前まで	4回以内	作付前:全面土壌混和又は 作業土壌混和 作物生育中:作業処理して 軽く覆土	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)
かぼちゃ	ケラ、ネキリムシ類					
かぶ	クスジノミハムシ	6kg	収穫45日前まで	2回以内	は種時:作業散布 作物生育中:株元散布	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類		出芽時	1回	土壌表面散布	
だいこん	クスジノミハムシ	6kg	は種時及び 生育期 但し、 収穫21日前まで	2回以内	は種時:作業土壌混和 作物生育中:株元土壌混和	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類		生育期 但し、 収穫21日前まで		土壌表面散布	
	ヒメダイコンバエ		は種時	1回	作業土壌混和	
はつかだいこん	コガネムシ類幼虫 ケラ タネバエ ネキリムシ類	4~8kg	は種時	1回	全面土壌混和又は 作業土壌混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類	6kg	生育期 但し、 収穫21日前まで	2回以内	土壌表面散布	
	クスジノミハムシ		は種時及び 生育期 但し、 収穫21日前まで	1回	作業土壌混和 作物生育中:株元土壌混和	
にんじん	ネキリムシ類		は種前	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)

作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジンを含む農薬の総 使用回数
未成熟とうもろこし	アワノメイガ	4~8kg	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
ヤングコーン	ネキリムシ類	6kg	出芽時	1回	土壌表面散布	1回
とうもろこし(子実)	アワノメイガ	4~8kg	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
いちご	コガネムシ類幼虫	4~8kg	は種時 定植時(仮植床) 定植時(本圃)	1回	土壌混和	1回
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く)	ケラ、キスジノミハムシ	6kg	は種時	1回	全面土壌混和	1回
こまつな	ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	1回	土壌表面散布	1回
	ケラ、キスジノミハムシ		は種時			
みずな	ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	1回	全面土壌混和	1回
	ケラ		は種時			
ひろしまな	ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	1回	全面土壌混和	1回
	ケラ、キスジノミハムシ		は種時			
なばな	ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	1回	全面土壌混和	1回
	ケラ		は種時			
なばな類(はなっこりー、なばなを除く)	ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	6kg	は種時	1回	全面土壌混和	1回
はなっこりー	ネキリムシ類	4kg	定植時	1回	作業土壌混和	1回
畑わさび	ワサビクダアザミウマ ワサビリイロサルソウムシ	3kg	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内
ふき	フキアブラムシ	4kg	収穫30日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
ふき(ふきのとう)	フキアブラムシ	4kg	萌芽前、収穫150日前まで	2回以内	株元散布	2回以内
食用ゆり	クロバネキノコバエ類	6kg	は種時 定植時 定植後、収穫30日前まで	1回	作業土壌混和 株元土壌混和	2回以内 (定植時は1回以内 定植後は1回以内)
たらのき	ネキリムシ類	6kg	種根定植後~萌芽前 種根定植後 但し、 萌芽後~萌芽後30日	1回	土壌表面散布	2回以内 (萌芽前は1回以内 萌芽後は1回以内)
にら	ネキリムシ類	5kg	定植時	1回	作業土壌混和	1回
もりあざみ	ネキリムシ類	6kg	は種時	1回	土壌表面散布	2回以内
オクラ	ネキリムシ類	6kg	収穫開始 30日前まで	2回以内	土壌表面散布	2回以内
業にんにく	ネキリムシ類	9kg	定植前	1回	全面土壌混和	1回
ははこぐさ	ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	1回	全面土壌混和	1回
なすな、はこべ、こおにたびらこ	ネキリムシ類	6kg	は種時	1回	全面土壌混和	1回
ごま	ネキリムシ類	6kg	は種前	1回	全面土壌混和	1回
ごぼう	ネキリムシ類	4kg	は種時	1回	全面土壌混和	1回
みつば	タネバエ	4kg	は種前	1回	土壌表面散布	1回
モロヘイヤ	ネキリムシ類	6kg	定植時	1回	土壌表面散布	1回
さとうきび	ハリガネムシ類	6kg	定植時	1回	土壌混和	1回
飼料用とうもろこし(子実)	ネキリムシ類	6kg	出芽時	1回	土壌表面散布	2回以内
飼料用とうもろこし(青刈り)	タマナヤガ	6kg	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
粟	ハリガネムシ	6kg	定植時	1回	種溝土壌混和	1回
ゆり	クロバネキノコバエ類	6kg	定植時	1回	作業土壌混和	2回以内 (定植時は1回以内 定植後は1回以内)
	コガネムシ類幼虫		定植後			
芝	シバツグ、スジキリヨトウ	6~8kg	発生初期	4回以内	散布	4回以内
	シバオサソウムシ成虫	8kg				