

## ダイアジノン粒剤5

登録番号	第10438号
農薬の種類	ダイアジノン粒剤
農薬の名称	ダイアジノン粒剤5

製剤毒性	普通
------	----

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

### 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	10a当たり 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総 使用回数
ブルーベリー		6kg	収穫14日前まで	2回以内	株元土壤混和	2回以内
かんしょ	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫30日前まで	3回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	3回以内 (マイクロカプセル剤の植付前 の処理は1回以内、マイクロ カプセル剤の散布は2回以内 粒剤の散布は2回以内)
ばれいしょ	ケラ ネキリムシ類		植付前	1回	全面土壤混和又は 作条土壤混和	3回以内(植付前の土壤混和 は1回以内)
キャベツ			は種時又は定植時	2回以内		
タネバエ	6kg	定植時	1回	全面土壤混和	2回以内	2回以内
ネキリムシ類						
コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫30日前まで	2回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	2回以内 (粒剤の生育期の処理は 1回以内)	2回以内
プロッコリー、カリフラワー	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時			
レタス	ネキリムシ類	6kg	定植時	1回	土壤表面散布	2回以内
非結球レタス	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	4~6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	2回以内
はくさい	6kg	6kg				
ミニトマト	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫前日まで	3回以内	作付前:全面土壤混和 又は作条土壤混和 作物生育中:作条処理 して軽く覆土	3回以内 (生育期は2回以内)
トマト、ピーマン	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	
なす	コガネムシ類幼虫		収穫開始10日前まで	3回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	3回以内 (粒剤の生育期の処理は 2回以内)
			収穫開始3日前まで			
	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	

作物名	適用病害虫名	10a当たり 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総 使用回数
とうがらし類	ケラ ネキリムシ類	4~6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	3回以内 (生育期は2回以内)
	コガネムシ類幼虫		収穫開始14日前まで 収穫60日前まで	3回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	
豆類(種実、ただし、だいすき、いんげんまめ、らっかせいを除く)	タネバエ	4kg	は種時	1回	作条土壤混和	4回以内 (種子粉衣は1回以内 粒剤は3回以内)
だいすき、えだまめ	コガネムシ類幼虫 タネバエ	4~6kg	収穫30日前まで	5回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	6回以内 (種子粉衣は1回以内 粒剤は5回以内 (生育期の処理は4回以内))
	マメシンクイガ、カメムシ類 シロイチモジマダライガ ダイズサヤタマバエ			4回以内	散布	
	フタスジヒメハムシ ネキリムシ類	6kg		5回以内	土壤表面散布	
	タネバエ	4kg	は種時	1回	作条土壤混和	
あずき	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫60日前まで	4回以内 2回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	4回以内 (種子粉衣は1回以内 は種時の処理は1回以内 生育期の処理は3回以内)
いんげんまめ	タネバエ	4kg	は種時		作条土壤混和	3回以内 (種子粉衣は1回 以内、粒剤は2回以内)
らっかせい	コガネムシ類幼虫	4~5kg	は種前	1回	全面土壤混和又は 作条土壤混和	1回
	タネバエ	4kg	は種時		作条土壤混和	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、實えんどうを除く)	コガネムシ類幼虫	4~6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	3回以内 (種子粉衣は1回以内 粒剤は2回以内)
さやえんどう 實えんどう	タネバエ	4kg	は種時	1回	作条土壤混和	6回以内 (種子粉衣は1回以内 粒剤は2回以内 乳剤は3回以内)
	コガネムシ類幼虫	4~6kg	は種時又は定植時 収穫30日前まで	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	
ねぎ、わけぎ、あさつき	タネバエ		は種時又は定植時		作付前:全面土壤混和 又は作条土壤混和 作物生育中:作条処理 して軽く覆土	2回以内
	コガネムシ類幼虫		収穫30日前まで		土壤表面散布	
	ケラ コオロギ	3~5kg	は種時又は定植時	1回	全面土壤混和又は 作条土壤混和	
	タネバエ タマネギバエ	6kg	収穫30日前まで		全面土壤混和	
葉たまねぎ	コガネムシ類幼虫	4~6kg	は種時	2回以内	全面土壤混和	2回以内 (は種時の土壤混和は1回 以内、定植時の土壤混和は 1回以内)
	タネバエ、タマネギバエ ケラ、コオロギ	3~5kg	定植時			
	コガネムシ類幼虫	4~6kg				
らっきょう	ネダニ類	6kg	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	タネバエ	6kg	は種時	1回	作条土壤混和又は 土壤表面散布	2回以内 (は種時及びは種前の 土壤混和は合計1回以内)
	ヒメクロユスリカ		は種前		土壤混和	

ダイアジノン粒剤5は「ズッキーニ」に農薬登録を取得しておりません、ご注意ください。  
(ズッキーニはかぼちゃに含まれません)

作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総 使用回数
すいか、メロン	コガネムシ類幼虫	4~6kg	収穫14日前まで	4回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)
	ケラ、ネキリムシ類					
にがうり	コガネムシ類、タネバエ ネキリムシ類	6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	2回以内
	ケラ、ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫、タネバエ					
きゅうり	ケラ、ネキリムシ類	4~6kg	収穫21日前まで	4回以内	作付前:全面土壤混和又は 作条土壤混和 作物生育中:作条処理して 軽く覆土	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)
	コガネムシ類幼虫					
かぼちゃ	コガネムシ類幼虫	6kg	収穫45日前まで	2回以内	は種時:作条散布 作物生育中:株元散布	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
かぶ	キスジノミハムシ	4~6kg	出芽時	1回	土壤表面散布	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
だいこん、はつかだいこん	コガネムシ類幼虫 ケラ、タネバエ	6kg	は種時	2回以内	全面土壤混和又は 作条土壤混和	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
きんじん	キスジノミハムシ	6kg	は種前	1回	は種時:作条土壤混和 作物生育中:株元土壤混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
ヤングコーン	アワノメイガ	4~6kg	出芽時	1回	土壤表面散布	1回
未成熟とうもろこし	ネキリムシ類	6kg	は種時	2回以内	散布	2回以内 (生育期は1回以内)
	アワノメイガ					
とうもろこし(子実)	コガネムシ類幼虫	4~6kg	は種時	1回	土壤表面散布	2回以内 (生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
いちご	ケラ、キスジノミハムシ	6kg	は種時又は定植時	2回以内	全面土壤混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
非轉球あぶらな科葉菜類(にま つな、みずな、ケール、ひろしまな を除く)	ケラ、キスジノミハムシ	4~6kg	定植時(仮植床)	1回	散布	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
こまつな	ケラ、キスジノミハムシ	6kg	は種時	2回以内	土壤混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
みずな	ケラ	6kg	は種時	1回	全面土壤混和	1回
	ネキリムシ類 キスジノミハムシ					
ひろしまな	ケラ、キスジノミハムシ	4kg	定植時	2回以内	土壤表面散布	1回
	ネキリムシ類					
なばな	ケラ ネキリムシ類 キスジノミハムシ	6kg	は種時	1回	全面土壤混和	1回
	ネキリムシ類					
はなっこりー	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	4kg	定植時	2回以内	作条土壤混和	2回以内 (は種前及びは種時は合計 1回以内、生育期は1回以内)
	ネキリムシ類					
畠わさび	ワサビクダアザミウマ ワサビルリロサルゾウムシ	3kg	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内
ふき	フキアブラムシ	4kg	収穫30日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
ふき(ふきのとう)			萌芽前、但し収穫 150日前まで	2回以内		2回以内

作物名	適用病害虫名	10a当たり 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総 使用回数
食用ゆり	クロバネキノコバエ類  ネキリムシ類	6kg	植付時	1回	作条土壤混和	2回以内 (植付時は1回以内 植付後は1回以内)
たらのき			植付後、収穫30日前 まで		株元土壤混和	
にら			種根定植後～萌芽 前			
もりあざみ			種根定植後 但し、 萌芽後～萌芽後30 日		土壤表面散布	2回以内 (萌芽前は1回以内 萌芽後は1回以内)
オクラ			5kg		作条土壤混和	1回
葉にんにく		6kg	定植時	2回以内		
ははこぐさ			は種時		土壤表面散布	2回以内
なずな、はこべ、こおにたびらこ			収穫開始 30日前まで			
ごま			9kg			
ごぼう	タネバエ ネキリムシ類 ハリガネムシ類 タマナヤガ クロバネキノコバエ類	6kg	植付前	1回	全面土壤混和	1回
みつば			は種時又は定植時			
モロヘイヤ			は種時			
さとうきび			は種前			
飼料用とうもろこし(子実)			は種時			2回以内
飼料用とうもろこし(青刈り)		6kg	出芽時	1回	土壤表面散布	
桑			収穫60日前まで	2回以内	散布	
ゆり			定植時	1回	植溝土壤混和	1回
			植付時		作条土壤混和	2回以内 (植付時は1回以内 植付後は1回以内)
			植付後		株元土壤混和	
芝	シバツトガ、スジキリヨトウ シバオサソウムシ成虫	6~9kg	発生初期	4回以内	散布	4回以内
	コガネムシ類幼虫	9kg				