

ダイアジノンSLゾル

登録番号	第17620号
農業の種類	ダイアジノンマイクロカプセル剤
農業の名称	ダイアジノンSLゾル

製剤毒性	普
------	---

実際の使用にあたりましては、農業の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法									
作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農業の総使用回数		
かんしょ やまのいも さといも さといも(葉柄) らっかせい いちご なし(苗木) つつじ類 ひのき(苗畑)、 すぎ(苗畑)	ナカジロシタバ	1000	100~ 300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の 処理は1回以内、マイクロカプセル剤の 散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内)		
	コガネムシ類幼虫	50	100L/10a	植付前	1回	全面土壌 混和又は 畝立て前 作条散布		3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の 処理は1回以内、マイクロカプセル剤の 散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内)	
		25							
		25							
		25~50							
		50							
		25							
		50							
		500					1000mL/㎡		ポット育苗時
	25	400mL/㎡	ポット育苗時	1回	土壌表面 に散布後、 軽く混和	1回			
25~50	100L/10a	植付時	2回以内	全面土壌 混和	2回以内				
100	200~ 400L/10a	植付前	2回以内	全面土壌 混和	2回以内				
さくら	アメリカシロヒトリ	1000	200~ 700L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内		
芝	シバツトガ、スジキリヨトウ、 シバオサゾウムシ成虫	1000	0.3L/㎡			4回以内		散布	4回以内
	ケラ	250	1L/㎡						
	シバオサゾウムシ幼虫	250	0.7~1L/㎡						
	250	0.7~1L/㎡							
樹木類	コガネムシ類幼虫	250	1L/㎡			コアリング時 (目土前)		散布	4回以内
		25	0.1L/㎡	張り芝前	土壌混和				
樹木類		16g/培土 ㎡	400~2000m L/培土㎡	鉢上げ時又は 鉢代え時	1回	培土混和			