

**日本化薬ダイアジノン水和剤34**

登録番号	第4250号
農薬の種類	ダイアジノン水和剤
農薬の名称	日本化薬ダイアジノン水和剤 34

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
りんご	モモシクイガ、ナシヒメシクイ、リンゴハナソウムシ、モンシロドクガ、リンゴフユシャク、リンゴワタムシ	1000	200～700L	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫、ナシゲンバイ、キンモンボソガ、アメリカシロヒトリ	1000～1500					
日本なし、西洋なし	コナカイガラムシ類若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、ナシゲンバイ、アメリカシロヒトリ	1000～1500		収穫14日前まで	6回以内		6回以内(休眠期は1回以内)
	モンシロドクガ、シンクイムシ類	1000					
もも	シンクイムシ類	1000		収穫前日まで	4回以内		4回以内
	カイガラムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類	1000～1500					
ネクタリン	シンクイムシ類	1000		収穫21日前まで	3回以内		3回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類	1000～1500					
おうとう	アブラムシ類、ハマキムシ類、ナシゲンバイ、アメリカシロヒトリ	1000～1500		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	ウメシロカイガラムシ	1000					
小粒核果類 (すももを除く)	シンクイムシ類	1000		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	アブラムシ類、ハマキムシ類、アメリカシロヒトリ	1000～1500					
すもも	シンクイムシ類	1000		収穫30日前まで	2回以内		2回以内
	クワコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アブラムシ類、ミドリヒメヨコバイ	1000～1500					
かき	オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫、ハマキムシ類、アメリカシロヒトリ	1000	収穫45日前まで	4回以内	4回以内		
	キボシマルトビムシ	600					
キャベツ	コナガ、アブラムシ類	2000	収穫30日前まで	2回以内	2回以内 (粒剤の生育期の処理は1回以内)		
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000					
	キボシマルトビムシ	600					
ブロッコリー、 カリフラワー	コナガ、アブラムシ類	2000	収穫21日前まで	2回以内	2回以内 (は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内)		
	キスジノミハムシ、アオムシ	1000					
	アブラムシ類	2000					
ほうれんそう		2000	収穫21日前まで	2回以内	2回以内 (は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内)		
		2000					
ねぎ	アザミウマ類	600～1000	2回以内	2回以内	2回以内		
	ネギハモグリバエ	600					

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農業の総使用回数
たまねぎ	アブラムシ類	2000	100～300L	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類	1000					
にんにく	ネギコガ	1000		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
しろうり	キボシマルトビムシ	600					
	アブラムシ類	2000					
すいか、メロン	ハダニ類	600～1000		収穫21日前まで	4回以内		4回以内 (粒剤の生育期の処理は3回以内)
	キボシマルトビムシ	600					
	アブラムシ類	2000					
かぼちゃ	ハダニ類	600～1000		収穫開始3日前まで	3回以内		3回以内 (粒剤の生育期の処理は2回以内)
	キボシマルトビムシ	600					
	アブラムシ類	2000					
なす(露地栽培)	ハダニ類	600～1000		収穫7日前まで	3回以内		3回以内(植付前の土壌混和は1回以内)
	キボシマルトビムシ	600					
なす(露地栽培)	アブラムシ類	2000		発生初期	4回以内		4回以内
	ハダニ類	1000					
ばれいしょ	テントウムシダマシ、 アブラムシ類	2000					
樹木類	アメリカシロヒトリ	1000～ 1500	200～700L				

