

## カヤク・ダイアジノン乳剤40

登録番号	第8151号
農薬の種類	ダイアジノン乳剤
農薬の名称	カヤク・ダイアジノン乳剤40

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法								
作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	キスジノミハムシ	1200倍						
ブロッコリー、カリフラワー	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで			2回以内	2回以内 (粒剤の生育期の処理は1回以内)
	キスジノミハムシ	1200倍						
	キボシマルトビムシ	700倍						
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍		収穫30日前まで			2回以内	2回以内 (2回以内は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内)
ねぎ、わけぎ	アブラムシ類、ネギコガ	1000倍						
	アザミウマ類	700～1200倍						
	ネギハモグリバエ	1000～2000倍						
あさつき	タマネギバエ	700倍		収穫21日前まで			2回以内	
	アブラムシ類、ネギコガ	1000倍						
	アザミウマ類	700～1200倍						
たまねぎ	ネギハモグリバエ	1000～2000倍		収穫開始3日前まで			3回以内	3回以内 (粒剤の生育期の処理は2回以内)
	タマネギバエ	700倍						
	アブラムシ類	1000倍						
なす(露地栽培)	アザミウマ類	700～1200倍		収穫7日前まで			3回以内	3回以内(植付前の土壌混和は1回以内)
	ネギハモグリバエ	1000～2000倍						
ばれいしょ	タマネギバエ	700倍		収穫開始7日前まで			3回以内	3回以内 (種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内)
	アブラムシ類	1000倍						
さやいんげん	アブラムシ類	1000倍		収穫開始14日前まで			3回以内	6回以内 (種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内、乳剤は3回以内)
	ハダニ類	1000～2000倍						
さやえんどう、実えんどう	アブラムシ類	1000倍	収穫14日前まで	4回以内	4回以内 (粒剤の生育期の処理は3回以内)			
	ハダニ類	1000～2000倍						
すいか、メロン	キボシマルトビムシ	700倍	植付時	1回	2回以内			
	アブラムシ類	1000倍						
	ハダニ類	1000～2000倍						
きゅうり	コガネムシ類幼虫	800倍	3L/m <sup>2</sup>	発生初期	4回以内			
	シバツトガ、スジキリヨトウ	1000倍						
	シバオサゾウムシ	1000倍						
芝	シバオサゾウムシ	1000倍	0.3～0.5L/m <sup>2</sup>	発生初期	4回以内			
	シバツトガ、スジキリヨトウ	1000倍						
	コガネムシ類幼虫	800倍						