

カヤクダブルストッパー

| | |
|-------|---------------------|
| 登録番号 | 第20749号 |
| 農薬の種類 | クロルピクリン・D-D くん蒸剤 |
| 農薬の名称 | カヤクダブルストッパー |

| | |
|------|---|
| 製剤毒性 | 劇 |
|------|---|

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

| 適用病害虫と使用方法 | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|
| 作物名 | 適用病害虫名 | 10a当り 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬 の総使用回数 | D-Dを含む農薬の総 使用回数 |
| かぶ、だいこん | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、萎黄病 | 30L (1穴当り3ml) | 作付の 10～15日前まで | 1回 | 土壌くん蒸 (30×30cmごとの 深さ15cmの穴に 1穴処理する。) | 1回 | 1回 |
| こまつな | | | | | | 2回以内(床土1回以内) | |
| セルリー | | | | | | 3回以内(床土1回以内、圃 場2回以内) | |
| かんしょ | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、立枯病、 つる割病 | | | | | 1回 | |
| オクラ | ネコブセンチュウ、 ネグサレセンチュウ、 立枯病 | | | | | 2回以内(床土1回以内) | |
| なす | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 半身萎凋病、青枯病、 半枯病 | | | | | 3回以内(床土1回以内、圃 場2回以内) | |
| トマト、ミニトマト | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 萎凋病、根腐萎凋病 | | | | | 2回以内(床土1回以内) | |
| ピーマン | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、青枯病、 萎凋病 | | | | | 3回以内(床土1回以内、圃 場2回以内) | |
| とうがらし類、ねぎ | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、萎凋病 | | | | | 2回以内(床土1回以内) | |
| ほうれんそう | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、炭疽病、 萎黄病 | | | | | 3回以内(床土1回以内、圃 場2回以内) | |
| いちご | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、つる割病 | 2回以内(床土1回以内) | | | | | |
| きゅうり、すいか | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、つる割病 | 1回 | | | | | |
| にがうり | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、しみ腐病、萎凋病、黒しみ病 | 2回以内(床土1回以内、圃 場1回以内) | | | | | |
| にんじん | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 しみ腐病、萎凋病、黒しみ病 | 1回 | | | | | |
| メロン | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、つる割病、 黒点根腐病、えそ斑点病 | 2回以内(床土1回以内、圃 場1回以内) | | | | | |
| しょうが | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、立枯病、 根茎腐敗病 | 2回以内(床土1回以内) | | | | | |
| みょうが(花種)、 みょうが(茎葉) | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ | 1回 | | | | | |
| かぼちゃ、はくさい | | | | | | | |
| レタス、非結球レタス | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、根腐病 | | | | | | |
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ、ネコブセ ンチュウ、そうか病、萎凋病 | | | | | | |
| やまのいも | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 褐色腐敗病 | | | | | | |
| ごぼう | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 黒あざ病、萎凋病 | | | | | | |
| こんにゃく、さといも | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、乾腐病 | | | | | | |

| 適用病害虫と使用方法 | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|-------------|---|-------------------------|--------------------|
| 作物名 | 適用病害虫名 | 10a当り 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬 の総使用回数 | D-Dを含む農薬の総 使用回数 |
| きく | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 萎凋病、半身萎凋病 | 30L (1穴当り3ml) | 作付の 10～15日前まで | 1回 | 土壌くん蒸 (30×30cmごとの 深さ15cmの穴に 1穴処理する。) | 3回以内(床土1回以内、圃 場2回以内) | 1回 |
| 花き類・観葉植物 (きくを除く) | ネグサレセンチュウ、 ネコブセンチュウ、 萎凋病(フザリウム菌)、 萎凋病(フザリウム菌)、 株枯病(フザリウム菌)、 乾腐病(フザリウム菌)、 球根腐敗病(フザリウム菌)、 立枯病(フザリウム菌)、 葉枯病(フザリウム菌)、 腐敗病(フザリウム菌) | | | | | | |