

コダールS水和剤

登録番号	第23414号
農薬の種類	プロメトリン・S-メトラクロール水和剤
農薬の名称	コダールS水和剤

製剤毒性	普
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法										
作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10a当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プロメトリンを含む農薬の総使用回数	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量					
たまねぎ	一年生雑草	定植活着15日後まで(雑草発生前)または中耕除草後、但し、収穫90日前まで(雑草発生前)	全土壌(砂土を除く)	150~225g	70~100L	1回	全面土壌散布	北海道	1回	1回
だいず、えだまめ、いんげんまめ、さやいんげん、べにばないんげん		は種後出芽前(雑草発生前)		225~300g	100L					
にんじん		植付後萌芽前(雑草発生前)		150g			全面土壌散布	2回以内		
やまのいも		萌芽後但し、植付45日後まで(イネ科雑草2葉期まで)		225~300g	全面土壌散布				1回	
とうもろこし		播種後出芽前(雑草発生前)		225~300g			全面土壌散布	1回		
飼料用とうもろこし										