

ドジョウピクリン／ニッカドジョウピクリン

登録番号	第5329号
農業の種類	クロルピクリンくん蒸剤
農業の名称	ドジョウピクリン／ ニッカドジョウピクリン

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農業の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法						
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農業の 総使用回数	
りんご	紋羽病	6～12ml	1回	土壌くん蒸	1回	
あぶらな科野菜 (キャベツ、こまつなを除く)	萎黄病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml			2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)	2回以内(床土1回以内)
こまつな		<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml			1回	
だいこん	亀裂褐変症	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml			1回	
はくさい	黄化病、軟腐病、根くびれ病	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)	
キャベツ	萎黄病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	1回		1回	
レタス、非結球レタス (サラダ菜を除く)	ビッグベイン病 根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<圃場>3ml <床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)	
サラダ菜	ビッグベイン病 根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<圃場>3ml <床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)	
ほうれんそう	萎凋病、立枯病、苗立枯病、 ホウレンソウケナゴコナダニ、 センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、一年生雑 草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	1回		2回以内(床土1回以内)	
うり科野菜 (すいか、きゅうり、メロン、にが うり、うり類(漬物用)を除く)	つる割病、白絹病、センチュ ウ類、ハリガネムシ類、ネキリ ムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		1回	
漬物用メロン		<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		
にがうり	疫病、つる割病、白絹病、苗 立枯病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)	2回以内(床土1回以内)		
うり類(漬物用、ただし、漬物用 メロンを除く)		<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		
きゅうり		<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		
メロン	つる割病、白絹病、黒点根腐 病、センチュウ類、ハリガネム シ類、ネキリムシ類、一年生 雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	1回	1回		
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	フザリウム立枯病 一年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>3～4ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		
すいか	つる割病、白絹病、センチュ ウ類、ハリガネムシ類、ネキリ ムシ類、一年生雑草 ホモブシス根腐病	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml <圃場>3ml		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)		
ピーマン、とうがらし類	萎凋病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	1回	2回以内(床土1回以内)		
トマト、ミニトマト	青枯病、萎凋病、半身萎凋 病、センチュウ類、ハリガネム シ類、ネキリムシ類、一年生 雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		
なす	青枯病、半身萎凋病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	1回	2回以内(床土1回以内)		
いちご	萎黄病、炭疽病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3～6ml <圃場>2～3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		

適用病害虫と使用方法							
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農業の 総使用回数		
アスパラガス	立枯病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml	1回	土壌くん蒸	2回以内(床土1回以内)		
セルリー	萎黄病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		
しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml	1回		2回以内(床土1回以内)		
うど	萎凋病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml			1回		
にんじん	センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、一年生雑 草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml			1回		
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、ハリ ガネムシ類、ネキリムシ類、 一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml			2回以内(床土1回以内)		
かんしょ	立枯病、つる割病、軟弱病、 センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、一年生雑 草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml			1回	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)	
さといも	疫病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一年 生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml				2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)	
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml				1回	
ばれいしょ	そうか病	<圃場>3ml				1回	1回
	青枯病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
ねぎ	白絹病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml			2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)	3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)	
あさつき、わけぎ							
たまねぎ	苗立枯病、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml	1回		1回		
パセリ	立枯病、一年生雑草	<圃場>3ml					
にんにく	イモグサレセンチュウ、一年 生雑草	<圃場>3ml					
薬用にんじん	根腐病、一年生雑草	<圃場>3ml					
こんにゃく	乾腐病、白絹病、根腐病、セ ンチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
豆類(種実、ただし、いんげん まめを除く)、 豆類(未成熟、ただし、さやいん げん、未成熟そらまめ、さやえ んどう、突えんどうを除く)	立枯病、白絹病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml		2回以内(床土1回以内)			
さやえんどう、突えんどう、い んげんまめ		<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml		3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)			
さやいんげん		<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml		2回以内(床土1回以内、圃場 1回以内)			
未成熟そらまめ		<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml		1回			
てんさい	黒根病、苗立枯病、センチュ ウ類、ハリガネムシ類、ネキリ ムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml		1回		1回	
あま、麦類	立枯病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
とうもろこし	白絹病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
陸稻	センチュウ類、ハリガネムシ 類、ネキリムシ類、一年生雑 草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
くちしや	ビッグベイン病	<圃場>3ml					
	根腐病、センチュウ類、ハリガ ネムシ類、ネキリムシ類、一 年生雑草	<圃場>2~3ml					
葉しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草	<床土・堆肥>3ml <圃場>2~3ml	2回以内(床土1回以内)				
ふき、ふき(ふきのとう)	半身萎凋病	<圃場>3ml	1回				
やまのいも(むかご)	褐色腐敗病、根腐病、セン チュウ類、ハリガネムシ類、ネ キリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3ml <圃場>2~3ml					

適用病害虫と使用方法							
作物名	適用病害虫・雑草名	1穴当り 使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の 総使用回数		
らっきょう	白絹病	<圃場>3ml	1回	土壌くん蒸	1回		
みつば	立枯病	<圃場>2~3ml					
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、萎凋病 (フザリウム菌)、萎黄病(フザ リウム菌)、株枯病(フザリウ ム菌)、乾腐病(フザリウム 菌)、球根腐敗病(フザリウム 菌)、立枯病(フザリウム菌)、 葉枯病(フザリウム菌)、腐敗 病(フザリウム菌)、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml	2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場 2回以内)		
きく	白絹病、立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
カーネーション	立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
りんどう	褐色根腐病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
ストック	苗立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
デルフィニウム	立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
スターチス、ゆり	萎凋細菌病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
ほおずき	軟腐病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
トルコギキョウ	株腐病、苗立枯病	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					
いちじく(苗木)	白絹病 センチュウ類	<圃場>3ml				1回	1回
桑	紋羽病	6~12ml					
たばこ	白絹病、立枯病、センチュウ 類、ハリガネムシ類、ネキリム シ類、一年生雑草	<床土・堆肥>3~6ml <圃場>2~3ml					