

土壌病害虫、線虫類、一年生雑草まとめて防除!

総合土壌くん蒸剤

土壌
消毒の
定番!

ドジョウピクリン®

ドジョウピクリンは日本化薬株式会社の登録商標です

- 種類名: クロルピクリンくん蒸剤 ●有効成分: クロルピクリン(化管法1種) 80.0% ●性状: 淡黄色透明液体
●包装: 20ℓ×1缶 ●有効年限: 5年 ●毒性: 医薬用外劇物 ●比重: 1.38(15℃)

特長

1. 土壌中の病害虫、線虫類、一年生雑草を同時防除。

土壌中の病原菌、害虫、線虫類、雑草の種子等に優れた防除効果を示します。

2. 有効成分が土壌中に拡散。

クロルピクリンは地中でガス化するため、土壌の隅々まで拡散・浸透します。

3. 効果と安全性を高める、シートによる被覆。

本剤は薬剤注入後、シートによる被覆が不可欠です。土壌被覆でガスの大気拡散を防ぎ、防除効果と環境に対する安全性を高めます。

4. 全面マルチ土壌消毒法などによる作業効率の大幅な向上。

薬剤注入と被覆を同時に行うことで、作業がより安全になり、作業負荷が軽減されます。

その他のクロルピクリン製品

カヤク 土壌くん蒸剤

クロールピクリン

- 高濃度(99.5%)のクロルピクリン製剤。
●病害虫、線虫類、一年生雑草をまとめて防除。

灌水チューブで処理する土壌くん蒸剤

クロピクフロー®

- 被覆後に薬剤を施用するため、処理時の刺激が少ない。
●灌水装置で処理するため、作業が簡単。

クロピクフローは日本化薬株式会社の登録商標です

クロルピクリン・D-D混合
土壌くん蒸剤

カヤク
ダブルストッパー®

- 2種混合により、クロルピクリン特有の刺激臭が軽減。
●2種混合により、殺線虫力がアップ、土壌病害へより安定した効果。

ダブルストッパーは日本化薬株式会社の登録商標です

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

この印刷物は2024年4月現在の登録内容に準拠して作成しました。

日本化薬株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号(明治安田生命ビル)
TEL.03-6731-5321 FAX.050-3730-0682

DPCPAL014Y2404Z2000

ドジョウピクリンの適用病害虫・雑草の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名・適用雑草名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬の総使用回数
りんご	紋羽病	1穴当り6~12mℓ			
いちじく(苗木)	白絹病、センチュウ類	<圃場>1穴当り3mℓ			
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		1回		1回
こまつな					2回以内(床土1回以内)
だいごん	亀裂褐変症	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ			1回
はくさい	黄化病、軟腐病、根くびれ病	<圃場>1穴当り2~3mℓ			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
キャベツ	萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
レタス、非結球レタス(サラダ菜を除く)	ビッグベイン病	<圃場>1穴当り3mℓ			1回
	根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	1回		1回
サラダ菜	ビッグベイン病	<圃場>1穴当り3mℓ			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
	根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
くきちしゃ	ビッグベイン病	<圃場>1穴当り3mℓ			1回
	根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り2~3mℓ	1回		2回以内(床土1回以内)
ほうれんそう	萎凋病、立枯病、苗木枯病、ホウレンソウケナガコナダニ、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
ピーマン、とうがらし類	萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
トマト、ミニトマト	青枯病、萎凋病、半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
なす	青枯病、半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く)	つる割病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	1回		1回
漬物用メロン					2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
メロン	つる割病、白絹病、黒点根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
にがうり			1回		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
うり類(漬物用、ただし漬物用メロンを除く)	疫病、つる割病、白絹病、苗木枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
きゅうり			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
かぼちゃ(かぼちゃ台を含む)	フザリウム立枯病	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ	1回		1回
	一年生雑草	<圃場>1穴当り3~4mℓ			
すいか	つる割病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
	ホモブシス根腐病	<圃場>1穴当り3mℓ			
いちご	萎黄病、炭疽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		1回		2回以内(床土1回以内)
アスパラガス	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
セルリー	萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		2回以内(床土1回以内)
しょうが					
葉しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ			1回
うど	萎凋病、一年生雑草				2回以内(床土1回以内)
にんじん	センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	1回		1回
かんしょ	立枯病、つる割病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
さといも	疫病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ			1回
ばれいしょ	そうか病	<圃場>1穴当り3mℓ			
	青枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
ねぎ					
	白絹病、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
あさつき、わけぎ					2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
たまねぎ	苗木枯病、一年生雑草				
せり科葉菜類(セルリーを除く)	立枯病(パセリ)、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<圃場>1穴当り2~3mℓ			
にんにく	イモグサレセンチュウ、一年生雑草	<圃場>1穴当り3mℓ			
薬用にんじん	根腐病、一年生雑草				
こんにゃく	乾腐病、白絹病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草		1回		1回
豆類(種実、ただし、いんげんまめを除く)					
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く)					
さやえんどう、実えんどう、いんげんまめ	立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ			2回以内(床土1回以内)
さやいんげん			2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
未成熟そらまめ					2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)
ふき	半身萎凋病	<圃場>1穴当り3mℓ			
ふき(ふきのとう)					
らっきょう	白絹病	<圃場>1穴当り2~3mℓ			
みつば	立枯病		1回		1回
てんさい	黒根病、苗木枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
あま、麦類	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
とうもろこし	白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
陸稲	センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草				
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、萎凋病(フザリウム菌)、萎黄病(フザリウム菌)、株枯病(フザリウム菌)、乾腐病(フザリウム菌)、球根腐敗病(フザリウム菌)、立枯病(フザリウム菌)、葉枯病(フザリウム菌)、腐敗病(フザリウム菌)、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	2回以内(床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内(床土1回以内、圃場2回以内)
きく	白絹病、立枯病				
カーネーション	立枯病				
りんどう	褐色根腐病				
ストック	苗木枯病				
デルフィニウム	立枯病				
スターチス、ゆり	萎凋細菌病				
ほおずき	軟腐病				
トルコギキョウ	株腐病、苗木枯病				
桑	紋羽病	1穴当り6~12mℓ			
たばこ	白絹病、立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	<床土・堆肥>1穴当り3~6mℓ <圃場>1穴当り2~3mℓ	1回		1回

土壌くん蒸