

ファインセーブフロアブル

登録番号	第24070号
農薬の種類	フロメキン水和剤
農薬の名称	ファインセーブフロアブル

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法									
作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り使用 液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	フロメキンを含む農 薬の総使用回数		
かんきつ	アザミウマ類、ミカンサビダニ	2000~4000	200~700L	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
マンゴー	アザミウマ類	2000							
なす	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000	100~300L	収穫前日まで	3回以内		3回以内		
	アザミウマ類	1000~2000							
トマト	トマトサビダニ	1000~4000							
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000~2000							
ミニトマト	アザミウマ類	1000							
	トマトサビダニ								
ピーマン	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	1000							
	アザミウマ類								
すいか、いちご	アザミウマ類	1000~2000							
はくさい	アオムシ	1000		収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	コナガ	1000~2000							
キャベツ	コナガ アザミウマ類		1000	収穫3日前まで					
	アオムシ								
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ、アザミウマ類	1000~2000	収穫14日前まで						
だいこん	コナガ								
アスパラガス	アザミウマ類	2000	100~800L	収穫前日まで					
にら			100~300L	収穫3日前まで					
わけぎ あさつき			ネギハモグリバエ	100~300L				100~300L	収穫前日まで
								100~300L	収穫3日前まで
たまねぎ			アザミウマ類	1000~2000	3回以内				
ほうれんそう			アザミウマ類	2000	100~300L	収穫14日前まで			
茶	チャノホソガ	2000~4000	200~400L	摘採14日前まで	2回以内	2回以内			
	チャノキイロアザミウマ	1000~4000							
きく	アザミウマ類	2000	100~300L	発生初期					