

ファインセーブフロアブル

登録番号	第24070号
農薬の種類	フロムキン水和剤
農薬の名称	ファインセーブフロアブル

製剤毒性	劇
------	---

実際の使用にあたりましては、農薬の登録内容を必ずラベルでご確認ください。

適用病害虫と使用方法								
作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	10a当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロムキンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	—	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000~4000	200~700L	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも、マンゴー		アザミウマ類	2000					
ぶどう		アザミウマ類 ブドウサビダニ		1000				
なす		温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	タバココナジラミ類※		100~300L			
	アザミウマ類		1000~2000	10L	3回以内	常温煙霧	3回以内	
ピーマン ししとう	—	タバココナジラミ類※	1000	100~300L	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
しよくようほおずき バジル しそ(花穂) さやいんげん 未成熟そらまめ にんじん		アザミウマ類	1000~2000					
トマト ミニトマト		アザミウマ類 タバココナジラミ類※	1000~2000	1000~4000	3回以内	収穫7日前まで	散布	3回以内
非結球あぶらな科 葉菜類		アザミウマ類 タバココナジラミ類※	2000					
すいか いちご		アザミウマ類	1000~2000	1000~2000	2回以内	収穫3日前まで	散布	2回以内
はくさい		アオムシ	1000					
キャベツ		アオムシ	1000	1000	3回以内	みょうが(花穂)の収 穫前日まで	散布	3回以内
レタス きく(葉) にら、食用ぎく しそ		アオムシ	2000					
みょうが(花穂)		温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	アザミウマ類	33	10L	みょうが(花穂)の収 穫前日まで	散布	3回以内
みょうが(莖葉)		—	—	1000	100~300L	みょうが(花穂)の収 穫前日まで	散布	3回以内
ブロッコリー カリフラワー	—	アオムシ アザミウマ類	1000	100~300L	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
		コナガ	1000~2000					
だいこん		アザミウマ類	2000	100~800L	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
ねぎ		ネギハモグリバエ						
わけぎ あさつき		アザミウマ類 ネギハモグリバエ	1000~2000	2000	100~800L	収穫14日前まで	2回以内	2回以内
たまねぎ		アザミウマ類						
ほうれんそう		アザミウマ類	2000	2000~4000 1000~4000	200~400L	発生初期	2回以内	2回以内
アスバラガス		アザミウマ類 タバココナジラミ類※						
茶		チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2000~4000 1000~4000	2000	100~300L	発生初期	2回以内	2回以内
きく、ほおずき グロリオサ ダリア ラナンキュラス		アザミウマ類						

※シルバーリーフコナジラミを含む