

殺虫・殺ダニ剤(気門封鎖剤)・殺菌剤・展着剤

☆封門



フーモン®

野菜類・果樹類の展着剤 として使用できます!



フーモンの成分が気門を封鎖しながら、
植物表面に付着し、濡れて広がります。

フーモン処理



無処理



▲ 蛍光塗料の付着状況からみるフーモンの展着効果 ▲

気門封鎖剤とは! ▶ 害虫の気門(空気の出入り口)をふさぐことで、窒息死させる薬剤です。

フーモンは日本化薬株式会社の登録商標です。



- 種類: ポリグリセリン脂肪酸エステル乳剤
- 成分: ポリグリセリン脂肪酸エステル……………82.5%
界面活性剤…………… 17.5%
- 性状: 淡黄色可乳化油状液体
- 包装: ポリ容器 (500ml×20本/ケース)

展着剤としてのフーモンの特長

優れた気門封鎖剤としての効果に加え、濡れ性と付着性に優れた展着剤(殺虫剤・殺菌剤)として、混用する化学農薬の効果を十分に発揮させます。



適用病害虫の範囲と使用方法

殺虫・殺ダニ剤、殺菌剤として使用する場合

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリグリセリン脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数
なし	ハダニ類、アブラムシ類	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日まで	—	散布	—
りんご	うどんこ病						
果樹類 (りんご、なしを除く)	ハダニ類						
野菜類	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類						
	とうもろこし きく						

展着剤として使用する場合

適用農薬名	作物名	使用量(希釈倍数)	使用方法
殺虫剤 殺菌剤	野菜類	10ml/散布液10ℓ(1000倍)	添加
	果樹類(りんごを除く)		
	りんご		

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布液調製の際はよくかき混ぜ、調製後はなるべく早く使用してください。
- 本剤薬液が害虫にむらなくかかるよう葉の裏表にていねいに散布してください。散布液が直接害虫にかからないと効果が期待できない場合があります。
- 本剤は残効が短く、害虫の卵に対して効果が劣るため、害虫の増殖期やほ場外からの飛び込み盛期には、5~7日間隔の連続散布で使用するか、他剤とのローテーション散布で使用してください。
- 散布水量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布直後の降雨が予想される場合は使用をさけてください。
- 作物の幼苗期や軟弱徒長苗、高温時には使用しないでください。
- おうとうの果実に薬害を生じるおそれがあるので、果実のある時期は使用をさけてください。
- ストロビルリン系薬剤との同時施用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 防除効果が低下するおそれがあるため展着剤は加用しないでください。
- 展着剤としての使用に当たっての注意
 - ・使用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
 - ・使用農薬の使用上の注意事項に薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載

されている場合には、本剤の使用をさけてください。

- 果実が果粉を形成する果樹類に使用する場合、果粉の溶脱を生じるおそれがあるため無袋栽培の果実や有袋栽培の袋かけ前の果実がある時期は使用をさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 使用残りの薬液が生じないよう調製し、使いきってください。散布器具、容器の洗浄水等は河川に流さず、周囲に影響のない方法で処理してください。空容器は環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 火災時の措置: 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時の措置: 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 輸送上の注意: 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 廃棄上の注意: 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 保管: 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所に置かないでください。

この印刷物は2024年9月現在の登録内容に準拠して作成しました。

フーモンの
最新情報・混用事例集は
こちら



日本化薬株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号(明治安田生命ビル)
TEL.03-6731-5321 FAX.050-3730-0682

DPFUM0013Y2409Z8000