



適用病害虫の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70トキを含む農薬の総使用回数			
なす	タバコナシジラ類 (シルバ-リーフナシジラを含む)	1000	100~ 300	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
	アザミマ類	1000~ 2000								
トマト	タバコナシジラ類 (シルバ-リーフナシジラを含む)	1000								
	トマトサビダニ									
ピーマン	アザミマ類	1000~ 2000								
すいか		2000								
いちご		1000								
はくさい	アムシ	1000~ 2000						収穫7日前まで	2回以内	2回以内
	コナガ									
キャベツ	アムシ	1000						収穫3日前まで	2回以内	2回以内
	アザミマ類									
だいこん	コナガ	1000~ 2000	収穫14日前 まで	3回以内	3回以内					
ねぎ	ネギハモグリバエ	2000	収穫3日前まで							
たまねぎ	アザミマ類	1000~ 2000		収穫14日前 まで	2回以内	2回以内				
ほうれんそう		2000								
茶	チャノホリガ	1000~ 2000	200~ 400	摘採14日前 まで	2回以内	2回以内				
	チャノイロアザミマ									
かんきつ	アザミマ類	2000	200~ 700	収穫7日前まで						
	ミカンサビダニ									