

令和4年12月21日

お客様各位

日本化薬株式会社  
アグロ事業部

## 「ファインセーブ®フロアブル」登録内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、ご愛顧いただいております殺虫剤「ファインセーブ®フロアブル」（登録番号第24070号）が令和4年12月21日付で登録内容変更（適用作物及び適用病害虫の追加）となりましたので、お知らせいたします。

変更後も引き続き、「ファインセーブ®フロアブル」をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名
第24070号	ファインセーブフロアブル	フロメトキン水和剤

ファインセーブは登録商標第5543984号

## ■変更内容

以下のとおり「作物名」及び「適用病害虫名」、「希釈倍数」が変更になりました。変更後の内容につきましては、別紙をご参照ください。

- (1) 作物名「かんきつ」に適用病害虫名「チャノホコリダニ」を追加する。
- (2) 作物名「ミニトマト」の適用病害虫名「トマトサビダニ」の希釈倍数を「1000～4000倍」に、「タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)」の希釈倍数を「1000～2000倍」に変更する。
- (3) 作物名「ししとう」に適用病害虫名「(タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む))」を追加する。
- (4) 作物名「アスパラガス」に適用病害虫名「タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)」を追加する。
- (5) 作物名「しそ(花穂)」（アザミウマ類）を追加する。
- (6) 作物名「みょうが(花穂)」（アザミウマ類）を追加する。
- (7) 作物名「みょうが(茎葉)」（アザミウマ類）を追加する。

■本剤に関するお問い合わせ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-1-1

日本化薬㈱ アグロ事業部 営業部 マーケティング担当

電話：03-6731-5321 FAX：050-3730-7867

別紙

変更後の適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロムキンを 含む農薬の 総使用回数					
かんきつ	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000～4000倍	200～700 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内					
マンゴー	アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内		3回以内	2回以内				
なす	タバココナジラミ類※	1000倍										
ピーマン	アザミウマ類	1000～2000倍										
ししとう		2000倍										
しよくようほおずき バジル、にんにく	アザミウマ類	2000倍										
トマト	アザミウマ類	1000～2000倍							3回以内	3回以内	3回以内	
ミニトマト	タバココナジラミ類※	1000～4000倍										
すいか、いちご	アザミウマ類	1000～2000倍							100～300 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内
はくさい	アオムシ	1000倍										
	コナガ	1000～2000倍										
キャバツ	コナガ		1000倍									
	アザミウマ類											
きく(葉)	アオムシ	1000倍	3回以内	3回以内	3回以内							
なら、食用ぎく	アザミウマ類	2000倍										
しそ	アザミウマ類	2000倍	3回以内	3回以内	3回以内							
しそ(花穂)												
ブロッコリー	アオムシ	1000倍	100～800 ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内						
カリフラワー	アザミウマ類	1000～2000倍										
だいこん	コナガ											
ねぎ	アザミウマ類	2000倍										
	ネギハモグリバエ											
わけぎ	アザミウマ類	1000～2000倍										
あさつき	ネギハモグリバエ											
たまねぎ	アザミウマ類	2000倍										
ほうれんそう	アザミウマ類											
アスパラガス	アザミウマ類 タバココナジラミ類※	2000倍					100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
みょうが(花穂)	アザミウマ類	1000倍	3回以内	散布 但し、花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	3回以内							
みょうが(茎葉)						みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	散布					
茶	チャノホソガ	2000倍～4000倍	200～400 ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	2回以内						
	チャノキイロアザミウマ	1000倍～4000倍										
きく	アザミウマ類	2000倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	2回以内	2回以内						

※シルバーリーフコナジラミを含む